



DISCIPLINA: ATENÇÃO BÁSICO DE SAÚDE
CURSO: ENFERMAGEM GERAL 6
TEMA: TÉTANO

Docente:
Leocádio
Francisco

O QUE É SARAMPO?

SARAMPO

É uma das afecções clássicas da infância, é uma doença aguda e autolimitada, contagio-infecciosa, exantemática, endemo-epidêmica, de etiologia virótica e alta transmissibilidade. Possui distribuição global, acometendo indiscriminadamente ambos os sexos, sem distinção de raça, clima ou nível social.

AGENTE ETIOLÓGICO

- O vírus do sarampo é um RNA vírus, que pertence à família Paramyxoviridae e é membro do subgrupo Morbillivirus.
- O vírus do sarampo é frágil. Fora do organismo, sua sobrevivência é restrita. Perde 60% de sua infectividade em três a cinco dias, em temperatura ambiente; a 37°C, sua meia-vida é de duas horas. Sobrevive bem ao frio e é destruído rapidamente pelos raios ultravioletas e mesmo pela luz espectral visível, na ausência de substrato protéico.

FORMA DE TRANSMISSÃO


- A porta de entrada do vírus no organismo se faz pela penetração de gotículas contaminadas, que entram em contato com as mucosas, especialmente de vias aéreas superiores.
- O contágio ocorre a partir do final do período de incubação até cinco dias após o aparecimento do exantema. Considera-se o período pré-exantemático como o de maior contagiosidade

QUADRO CLINICO

- Após o período de incubação de cerca de onze dias, a doença se manifesta com pródromos de três a quatro dias de duração.
- febre,
- mal-estar,
- coriza seromucosa
- mucopurulenta,
- Tosse seca,
- conjuntivite com fotofobia com epífora
- Exantema maculopapular de tonalidade avermelhada



SARAMPO



DIAGNÓSTICO

- Historia clínica
- Anamnese
- Exame físico

□ **Exames auxiliar de diagnostico**

- Fazer pedido de virológico é excepcionalmente necessário para confirmar a suspeita.

TRATAMENTO

- Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)
- Não há terapêutica específica contra o vírus do sarampo e tampouco drogas capazes de prevenir ou interromper os sintomas da doença uma vez instalados. Entretanto, vários estudos têm observado que o uso de **vitamina A** em crianças com sarampo tem se associado à redução de mortalidade e da morbidade.
- 19-B-7 VACINA ANTI-SARAMPO, Inj. 0,5 mL com respectivo diluente - Amp.

PREVENÇÃO

- A doença torna-se mais grave quando atinge mães em período de amamentação, crianças desnutridas e adultos.
- Vacinar é o meio mais eficaz de prevenção contra o sarampo. A vacina tetraviral é indicada para prevenção do sarampo e está disponível nos postos de saúde para crianças a partir de 12 meses de idade.

FIM